

ΒΟΤΑΜΙΣΟΛ

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ



Βιοδιεγέρτης ενεργοποίησης των φυτών βασισμένος σε φυτικής προέλευσης ελεύθερα L- αμινοξέα. Το ΒΟΤΑΜΙΣΟΛ βελτιώνει την φυτρωτικότητα, την καρπόδεση, το χρώμα των καρπών και αυξάνει την συγκέντρωση των σακχάρων και των βιταμινών.



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ: 50-100 g/στρ. Εφαρμόζεται 3-4 φορές μετά την μεταφύτευση.

ΔΕΝΔΡΑ: 100-150g/στρ. Εφαρμόζεται κατά την βλάστηση.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 100-150g/στρ. Εφαρμόζεται κατά την βλάστηση.

ΑΜΠΕΛΙ: 50-100 g/στρ. Εφαρμόζεται κατά την μεταφύτευση όταν είναι σε κατάσταση "στρες". Διαφυλλική εφαρμογή κατά την βλάστηση, πριν την καρπόδεση. Η τελευταία εφαρμογή να γίνει 3 εβδομάδες πριν την συγκομιδή.

ΕΛΙΑ: 100-150g/στρ. Εφαρμόζεται κατά την Άνοιξη-Φθινόπωρο.

ΦΡΑΟΥΛΑ: 25-50g/στρ. Εφαρμόζεται 3 φορές κατά την διάρκεια της καλλιέργειας.

ΣΙΤΑΡΙ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: 50-100 g/στρ. Εφαρμόζεται διαφυλλικά μαζί με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ΓΚΑΖΟΝ: 50-100 g/στρ. Εφαρμόζεται διαφυλλικά 10 μέρες μετά το κούρεμα.

ΒΑΜΒΑΚΙ: 50-100 g/στρ. Εφαρμόζεται διαφυλλικά στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και στην αρχή της ανθοφορίας.

ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: 50-100 g/στρ. Εφαρμόζεται 3-4 φορές μετά την μεταφύτευση.

ΠΑΤΑΤΑ :25-50 g/στρ. Εφαρμόζεται 3-4 φορές μετά την μεταφύτευση.

ΣΥΝΘΕΣΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ελεύθερα L-αμινοξέα...45,0% β/β
- Ολικό άζωτο.....18,0% β/β
- Αμμωνιακό άζωτο.....10,0% β/β
- Οργανικό άζωτο.....8,0% β/β

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί είτε διαφυλλικά είτε με ριζοπότισμα. Για σπορεία εφαρμόστε 100g/στρ. σε αραιώση 0,1%-0,3%. Για την βελτίωση του ριζικού συστήματος συνιστώνται 2 εφαρμογές σε διαστημα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το ΒΟΤΑΜΙΣΟΛ μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα φυτοφάρμακα και λιπάσματα.